



VCI-MÉRIDA

EQUIPO DE TERAPIA INTRAVENOSA DEL HOSPITAL DE MÉRIDA (S.M.I.)



MI CARNET PICC

Soy portador de un PICC de la marca....., canalizado en la vena....., del miembro superior...... El número de lote es..... y la referencia...... Para informar al personal sanitario que me atiende y utilice mi catéter, tengo canalizado un PICC de longitud..... cm y un calibre de..... French, quedando fuera de mi cuerpo..... cm. El Equipo de Terapia Intravenosa, de la UCI del Hospital de Mérida, canalizó mi PICC el día...... Realizaré las curas semanales y me pondré en contacto con mi enfermera del Equipo de Terapia Intravenosa, para resolver todas mis dudas referentes a MI PICC.

GRACIAS por el adecuado mantenimiento y cuidado de mi catéter.

CONTACTO

Equipo de Terapia Intravenosa
Servicio de Medicina Intensiva
Hospital de Mérida
Tercera planta
Bloque posterior
C/ Antonio Campos Hoyos s/n
924 38 10 00

Extensión 81072



SI TIENES CUALQUIER DUDA,
CONTACTE TELEFÓNICAMENTE
CON EL EQUIPO DE TERAPIA
INTRAVENOSA DEL SERVICIO DE
MEDICINA INTENSIVA DEL
HOSPITAL DE MÉRIDA

EQUIPO DE TERAPIA INTRAVENOSA



RECOMENDACIONES PARA
PACIENTES PORTADORES
DE CATÉTER
CENTRAL DE INSERCIÓN
PERIFÉRICA
(PICC)



CUIDADOS DOMICILIARIOS

Soy responsable de MI PICC, el cual me permite realizar actividades de la vida diaria con normalidad, para ello debo cuidarlo con precaución:

- Cubrir el antebrazo con film transparente durante la ducha, retirándolo posteriormente.
- Evitar mojar, ni sumergir el brazo en agua.
- Cubrirlo en espacios potencialmente contaminantes.
- Evitar deportes de contacto y/o natación.
- No realizar movimientos de rotación con máxima amplitud con el brazo afectado.
- Evitar toma de TA en el miembro canalizado.
- Evitar ropa ajustada en las zonas de articulaciones, en el miembro canalizado.

MI CATÉTER

Un PICC es un acceso venoso canalizado en una vena profunda de mi brazo, por una enfermera especializada mediante técnica ecoguiada.

Mi PICC podrá utilizarse por personal cualificado, manteniendo las medidas higiénicas y de seguridad adecuadas, entre otras cosas, para:

- Administración de medicación con características especiales (pH y osmolaridad extremo).
- Administración de nutrición parenteral total.
- Administración de hemoderivados.
- Realización de extracciones sanguíneas.
- Administración de contrastes en pruebas de imagen.
- Realización de pruebas diagnósticas.

SITUACIONES DE ALERTA

Deberá ponerse en contacto con el Equipo de Terapia Intravenosa del Hospital de Mérida, ante cualquiera de los siguientes situaciones.

- Salida accidental del catéter.
- Dolor en la zona de punción.
- Fiebre y enrojecimiento de la zona.
- Secreciones purulentas en el punto de inserción.
- Apósito sucio, mojado o despegado.
- Sangrado a través del punto de inserción o de las luces del catéter.
- Desconexiones accidentales de los taponés.

